



Publicado em 19/05/2025 - 10:40

Adenocarcinoma do colo uterino. Achadas da ressonância magnética

Lesão expansiva e infiltrativa no colo uterino, centrada na parede anterior, que oblitera o canal endocervical, apresentando sinal intermediário em T2 (A) e realce ao meio de contraste (B).

Citar esse artigo (NBR 6023)

PEREIRA, PN. Adenocarcinoma do colo uterino. Achadas da ressonância magnética.. Dr.Pixel. Campinas: Dr Pixel, 2024. Disponível em: <https://drpixel.fcm.unicamp.br/conteudo/adenocarcinoma-do-colo-uterino-achadas-da-ressonancia-magnetica>. Acesso em: 19 Mai. 2025

Conteúdos relacionados

- Ressonância magnética no estadiamento do câncer de colo uterino
- Diferença entre a TC e a RM no estadiamento local do câncer de colo uterino
- Raio-x de tórax: anatomia radiológica
- Raio-x do abdômen - anatomia radiológica
- Tc de abdômen - anatomia radiológica
- Derrame pleural

Autor Patrick Nunes Pereira

Graduação médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Residência médica em Radiologia pela UNICAMP. Título de especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Pós-graduação em Radiologia da Mama e Pelve Feminina pelo Instituto de Radiologia da Universidade de São Paulo (InRad-USP). Médico radiologista assistente do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti - CAISM/UNICAMP, com atuação em Tomografia computadorizada e Ressonância Magnética.

<https://drpixel.fcm.unicamp.br/conteudo/adenocarcinoma-do-colo-uterino-achadas-da-ressonancia-magnetica>

Veículo: Online -> Site -> Site Dr. Pixel